All studies

Study	TE	seTE	MD	95%−CI	Weight (fixed)	Weight (random)
A	1.00	0.1000	1.00	[0.80; 1.20]	10.0%	10.0%
B	2.00	0.1000	2.00	[1.80; 2.20]	10.0%	10.0%
C	3.00	0.1000	3.00	[2.80; 3.20]	10.0%	10.0%
D	4.00	0.1000	4.00	[3.80; 4.20]	10.0%	10.0%
E	5.00	0.1000	5.00	[4.80; 5.20]	10.0%	10.0%
F	6.00	0.1000	6.00	[5.80; 6.20]	10.0%	10.0%
G	7.00	0.1000	7.00	[6.80; 7.20]	10.0%	10.0%
H	8.00	0.1000	8.00	[7.80; 8.20]	10.0%	10.0%
I	9.00	0.1000	9.00	[8.80; 9.20]	10.0%	10.0%
J	10.00	0.1000	10.00	[9.80; 10.20]	10.0%	10.0%
Fixed effect model			**5.50**	**[5.44; 5.56]**	**100.0%**	**−−**
Random effects model			**5.50**	**[3.62; 7.38]**	**−−**	**100.0%**

Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 9.1567, p = 0